

EC FERTILIZER
KALSİYUM NİTRAT ÇÖZELTİSİ
LIFERTY CALNIT

Liferty Calnit bitkilerin ihtiyacı olan Kalsiyum ve Azot bakımından zengin bir gübresidir. Yüksek çözünürlüğü sayesinde damlama sulama sistemlerinde kullanılabilir. Bitkilerin kalsiyum ihtiyacı genellikle toprak yoluyla karşılanamadığı durumlarda ve özellikle Kalsiyum eksikliğinin sebep olduğu fizyolojik bozukluklar ve verimsiz bitkiler ile karşılaşılan durumlarda bitkinin kalsiyum ihtiyacını karşılamak amacıyla bitkinin gelişimini ve çiçeklenmesini için gerekli bir besin maddesidir. Çözünürlüğü ve yaprak uygulamalarda bitki gelişimine katkısı nedeniyle yaprak gübreleme programlarında kullanılabilir. Kalsiyum eksikliğinin sebep olduğu fizyolojik bozukluklar ile sebze (domates) ve meyve (elma) ağaçlarında karşılaşılan sorunlar; Çiçek dökümü, Çiçek yanıklığı, Meyve çatlaması, Meyve ve yaprak yanıklığı, Meyve ve yaprak lekelenmesi, Meyve ve yaprak kıvrılmasıdır.

TAMAMI SUDA ÇÖZÜNÜR
GARANTİ EDİLEN İÇERİK NCW
• Kalsit Çözücü
Toplam Azot (N) % 15 Kalsiyum Oksit (CaO) % 26 Suda Çözünür Kalsiyum (Ca) % 18 Suda Çözünür Kalsiyum Nitrat Azotu (CaNO3) % 14,5 Suda Çözünür Azot (N) % 15

KULLANILDIĞI BİTKİLER, UYGULAMA ZAMANI VE MİKTARI

BİTKİ	UYGULAMA ZAMANI	UYGULAMA ŞEKLİ (damlama sulama sistemi)
Domates, Biber, Patlıcan, Salatalık	Meyve oluşumu ve iri gelişim dönemi boyunca	10 kg/da, 2 kez ilk ay ara ile
Kiraz, Çilek, Şeftali	Meyve oluşumu ve iri gelişim dönemi boyunca	10 kg/da, 2 kez ilk ay ara ile
Muz	Meyve oluşumu ve iri gelişim dönemi boyunca	10 kg/da, 2 kez ilk ay ara ile
Elma	Meyve oluşumu ve iri gelişim dönemi boyunca	10 kg/da, 2 kez ilk ay ara ile
Karpuz	Meyve iri tohum oluşumu ve iri gelişim dönemi	10 kg/da, 2 kez ilk ay ara ile
Kıvırcık, Marul, Pancar, Lahana	Meyve, kök, yaprak gelişim dönemi	10 kg/da, 2 kez ilk ay ara ile
Fasulye	Meyve oluşumu ve iri gelişim dönemi	10 kg/da, 2 kez ilk ay ara ile
Pamuk, Ayçiçek	Meyve oluşumu ve iri gelişim dönemi	10 kg/da, 2 kez ilk ay ara ile
Patates, Şeker Pancarı, Soğan	Yumrular ve iri gelişim dönemi	10 kg/da, 2 kez ilk ay ara ile
Mısır, Buğday	Tohumlar ve iri gelişim dönemi	10 kg/da, 2 kez ilk ay ara ile
Ceviz	Yaprak ve kurtlanma dönemi	10 kg/da, 2 kez ilk ay ara ile
Turunç, Limon, Mandalina	Meyve iri ve yaprak gelişim dönemi	10 kg/da, 2 kez ilk ay ara ile
Kayısı, Şeftali, Nektarin	Meyve iri ve yaprak gelişim dönemi	10 kg/da, 2 kez ilk ay ara ile
Yonca, Çayır	Sürgün ve yaprak gelişim dönemi	10 kg/da, 2 kez ilk ay ara ile
Fındık	Meyve iri ve yaprak gelişim dönemi	10 kg/da, 2 kez ilk ay ara ile

* Kanat kasaya verildiğinde - Kaçın diyerek kaçak ancak yaşayan anlamı yaşamak, uzun süre yaşamak anlamına kullanılmaktadır.

EC FERTILIZER
MAGNEZYUM NİTRAT ÇÖZELTİSİ
LIFERTY MAGNET

Liferty Magnet bitkilerin ihtiyacı olan Magnezyum ve Azot bakımından zengin bir gübresidir. Yüksek çözünürlüğü sayesinde damlama sulama sistemlerinde kullanılabilir. Bitkilerin magnezyum ihtiyacı genellikle toprak yoluyla karşılanamadığı durumlarda ve özellikle Magnezyum eksikliğinin sebep olduğu fizyolojik bozukluklar ile karşılaşılan durumlarda bitkinin magnezyum ihtiyacını karşılamak amacıyla bitkinin gelişimini ve çiçeklenmesini için gerekli bir besin maddesidir. Çözünürlüğü ve yaprak uygulamalarda bitki gelişimine katkısı nedeniyle yaprak gübreleme programlarında kullanılabilir. Magnezyum eksikliğinin sebep olduğu fizyolojik bozukluklar ile sebze (domates) ve meyve (elma) ağaçlarında karşılaşılan sorunlar; Çiçek dökümünde artış, Çiçek yanıklığı, Meyve ve yaprak yanıklığı, Meyve ve yaprak lekelenmesi, Meyve ve yaprak kıvrılmasıdır. Çözünürlüğü ve yaprak uygulamalarda bitki gelişimine katkısı nedeniyle yaprak gübreleme programlarında kullanılabilir.

TAMAMI SUDA ÇÖZÜNÜR
GARANTİ EDİLEN İÇERİK NCW
Mirsa Azotu (NO3) % 11
Suda Çözünür Magnezyum Oksit (MgO) % 9

KULLANILDIĞI BİTKİLER, UYGULAMA ZAMANI VE MİKTARI

BİTKİ	UYGULAMA ZAMANI	UYGULAMA ŞEKLİ (damlama sulama sistemi)
Domates, Biber, Patlıcan, Salatalık	Meyve oluşumu ve iri gelişim dönemi boyunca	10 kg/da, 2 kez ilk ay ara ile
Kiraz, Çilek, Şeftali	Meyve oluşumu ve iri gelişim dönemi boyunca	10 kg/da, 2 kez ilk ay ara ile
Muz	Meyve oluşumu ve iri gelişim dönemi boyunca	10 kg/da, 2 kez ilk ay ara ile
Elma	Meyve oluşumu ve iri gelişim dönemi boyunca	10 kg/da, 2 kez ilk ay ara ile
Karpuz	Meyve iri tohum oluşumu ve iri gelişim dönemi	10 kg/da, 2 kez ilk ay ara ile
Kıvırcık, Marul, Pancar, Lahana	Meyve, kök, yaprak gelişim dönemi	10 kg/da, 2 kez ilk ay ara ile
Fasulye	Meyve oluşumu ve iri gelişim dönemi	10 kg/da, 2 kez ilk ay ara ile
Pamuk, Ayçiçek	Meyve oluşumu ve iri gelişim dönemi	10 kg/da, 2 kez ilk ay ara ile
Patates, Şeker Pancarı, Soğan	Yumrular ve iri gelişim dönemi	10 kg/da, 2 kez ilk ay ara ile
Mısır, Buğday	Tohumlar ve iri gelişim dönemi	10 kg/da, 2 kez ilk ay ara ile
Ceviz	Yaprak ve kurtlanma dönemi	10 kg/da, 2 kez ilk ay ara ile
Turunç, Limon, Mandalina	Meyve iri ve yaprak gelişim dönemi	10 kg/da, 2 kez ilk ay ara ile
Kayısı, Şeftali, Nektarin	Meyve iri ve yaprak gelişim dönemi	10 kg/da, 2 kez ilk ay ara ile
Yonca, Çayır	Sürgün ve yaprak gelişim dönemi	10 kg/da, 2 kez ilk ay ara ile
Fındık	Meyve iri ve yaprak gelişim dönemi	10 kg/da, 2 kez ilk ay ara ile

* Kanat kasaya verildiğinde - Kaçın diyerek kaçak ancak yaşayan anlamı yaşamak, uzun süre yaşamak anlamına kullanılmaktadır.

EC FERTILIZER
MAGNEZYUM SÜLFAT ÇÖZELTİSİ
LIFERTY

Liferty Magnezyum gübreleri yaprak verimi ve kalitesini temel taşıdır. Bunlar doğal kaynaklı olmaya devam ediyor ve bitkilerin ihtiyaçlarına göre tasarlanmıştır. Magnezyum, bitkilerin yaşamı ve gelişimi ile ilgili birçok enzimatik reaksiyonda yer almaktadır. Magnezyum eksikliğinin sebep olduğu fizyolojik bozukluklar ile karşılaşılan sorunlar; Yaprak kenarlarının sarımı, Yaprak damarlarının sarımı, Yaprak lekelenmesi, Yaprak kıvrılmasıdır. Çözünürlüğü ve yaprak uygulamalarda bitki gelişimine katkısı nedeniyle yaprak gübreleme programlarında kullanılabilir.

Garanti Edilen İçerik, % NCW
• Suda Çözünür Magnezyum Oksit (MgO) 9
• Suda Çözünür Kükürt Trioksit (SO3) 16

KULLANILDIĞI BİTKİLER, UYGULAMA ZAMANI VE MİKTARI

BİTKİ	UYGULAMA ZAMANI	UYGULAMA ŞEKLİ (damlama sulama sistemi)
Domates, Biber, Patlıcan, Salatalık	Meyve oluşumu ve iri gelişim dönemi boyunca	10 kg/da, 2 kez ilk ay ara ile
Kiraz, Çilek, Şeftali	Meyve oluşumu ve iri gelişim dönemi boyunca	10 kg/da, 2 kez ilk ay ara ile
Muz	Meyve oluşumu ve iri gelişim dönemi boyunca	10 kg/da, 2 kez ilk ay ara ile
Elma	Meyve oluşumu ve iri gelişim dönemi boyunca	10 kg/da, 2 kez ilk ay ara ile
Karpuz	Meyve iri tohum oluşumu ve iri gelişim dönemi	10 kg/da, 2 kez ilk ay ara ile
Kıvırcık, Marul, Pancar, Lahana	Meyve, kök, yaprak gelişim dönemi	10 kg/da, 2 kez ilk ay ara ile
Fasulye	Meyve oluşumu ve iri gelişim dönemi	10 kg/da, 2 kez ilk ay ara ile
Pamuk, Ayçiçek	Meyve oluşumu ve iri gelişim dönemi	10 kg/da, 2 kez ilk ay ara ile
Patates, Şeker Pancarı, Soğan	Yumrular ve iri gelişim dönemi	10 kg/da, 2 kez ilk ay ara ile
Mısır, Buğday	Tohumlar ve iri gelişim dönemi	10 kg/da, 2 kez ilk ay ara ile
Ceviz	Yaprak ve kurtlanma dönemi	10 kg/da, 2 kez ilk ay ara ile
Turunç, Limon, Mandalina	Meyve iri ve yaprak gelişim dönemi	10 kg/da, 2 kez ilk ay ara ile
Kayısı, Şeftali, Nektarin	Meyve iri ve yaprak gelişim dönemi	10 kg/da, 2 kez ilk ay ara ile
Yonca, Çayır	Sürgün ve yaprak gelişim dönemi	10 kg/da, 2 kez ilk ay ara ile
Fındık	Meyve iri ve yaprak gelişim dönemi	10 kg/da, 2 kez ilk ay ara ile

* Kanat kasaya verildiğinde - Kaçın diyerek kaçak ancak yaşayan anlamı yaşamak, uzun süre yaşamak anlamına kullanılmaktadır.

NİTRİK ASİT

Damlama sulama yöntemiyle gübrelemek yaprak damlama hortumlarında zamanla meydana gelen tıkanmaları gidermekte kullanırız. Nitrik Asit, ayrıca Kireç-siliç-tirat asitsizdir dolayı bir miktar da bitki besleme gücü gösterebilir. Kireç çözücü, damlama ucu ve PE diyaframları temizlik kasıyor etkili.

GARANTİ EDİLEN İÇERİK NCW
NO3-N % 12,5

KULLANILDIĞI BİTKİLER, UYGULAMA ZAMANI VE MİKTARI

BİTKİ	UYGULAMA ZAMANI	UYGULAMA ŞEKLİ (damlama sulama sistemi)
Domates, Biber, Patlıcan, Salatalık, Kiraz, Çilek, Şeftali, Muz, Elma, Karpuz, Kıvırcık, Marul, Pancar, Lahana, Fasulye, Pamuk, Ayçiçek, Patates, Şeker Pancarı, Soğan, Mısır, Buğday, Ceviz, Turunç, Limon, Mandalina, Kayısı, Şeftali, Nektarin, Yonca, Çayır, Fındık	Sezon gelişim ve iri meyve oluşum dönemi	1,5 kg/da
Tohum Ekimleri	Sezon gelişim ve iri meyve oluşum dönemi	1,5 kg/da
Fidelerin Dik